

Lietošanas instrukcija

POTASSIUM IODIDE 2% UNIMED PHARMA® acu pilieni, šķīdums.
(Kalii iodidum)

Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Šīs zāles ir pieejamas bez receptes. Tomēr Jums jālieto POTASSIUM IODIDE 2% acu pilieni rūpīgi, lai no zāļu lietošanas iegūtu vislabākos rezultātus.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicāiet farmaceitam.
- Ja Jūs veselības stāvoklis pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsaazinās ar savu ārstu.

Ja Jūs novērojat kādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā Jūs varat uzzināt:

1. Kas ir POTASSIUM IODIDE 2% acu pilieni un kādam nolūkam tos lieto
2. Kas jā dara pirms POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienu lietošanas
3. Kā pareizi lietot POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus
6. Sīkāka informācija

1. Kas ir POTASSIUM IODIDE 2% acu pilieni un kādam nolūkam tos lieto.

POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienu sastāvā ir kālija jodīds un nelielā daudzumā jods, kas pastiprina peptīdu un lipīdu vielmaiņu un nedaudz samazina asins elementu agregāciju. Vietēji lietojot, jods un jodīdi parasti mazina acs stiklainā ķermeņa kataraktu. Ir iespējams palēnināt apduļķošanos un redzes asuma pazemināšanos, ko izraisa vecuma katarakta.

POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus lieto, lai sekmētu uzsūkšanos acī, īpaši, ja ir izdalījumi, stiklveida ķermeņa asiņošana un dažādas izcelsmes kataraktas, tīklenes un acs ābola apvalka asinsvadu atero- un arteriolosklerotiskas pārmaiņas, tīklenes bojājumi un tuvredzība, kataraktas sākuma stadijā, radzenes iekaisums un redzes nerva atrofija (uz sifilisa pamata), sēnīšu radīta konjunktīvas un radzenes iekaisuma papildārstēšanai.

Preparātu var lietot pieaugušie, pusaudži un arī bērni no 3 gadu vecuma.

2. Kas jā dara pirms POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienu lietošanas.

Nelietojiet POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus šādos gadījumos:

POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus nedrīkst lietot tādā gadījumā, ja ir

- pārmērīgs jutīgums pret jodu vai kādu citu šā preparāta sastāvdaļu,
- grūtniecība un zīdīšana
- hroniska sejas ādas piodermija,
- hemorāģiska diatēze (aktīva asiņošana),
- kā arī pacienti, kuriem ir vairogdziedzera darbības traucējumi.
- jaundzimušiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Ja uz jums attiecas kāds no iepriekšējiem punktiem, vai aprakstītie gadījumi rodas acu pilienu POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienu lietošanas laikā, lūdzam apspriesties ar savu ārstu.

Īpaša piesardzība, lietojot POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus, nepieciešama šādos gadījumos:

Acs priekšējā segmenta sēnīšu slimības gadījumā vienmēr ir nepieciešama arī speciāla ārstēšana. Zāļu lietošanas laikā nav atļauts valkāt mīkstās kontaktlēcas.

Cietās kontaktlēcas zāļu lietošanas brīdī jāizņem, un tās var ielikt atpakaļ, bet ne agrāk kā 30 minūtes pēc zāļu lietošanas.

Ievērojot noteiktās devas un lietošanas režīmu, pārdozēšana praktiski nav iespējama.

Ja zāles nejauši iedzer bērns, tūlīt pat griezieties pēc medicīniskas palīdzības.

Citu zāļu lietošana:

POTASSIUM IODIDE 2% acu pilieni var ietekmēt citu vienlaikus lietotu zāļu darbību - piemēram jodu saturošu preparātu, vairogdziedzera saslimšanu ārstēšanā izmantotu preparātu darbību. Tādēļ jūsu ārstam jāzina par visām zālēm, kuras pašlaik lietojat, nesen lietotajām zālēm un zālēm, kuras plānojat sākt lietot — gan recepšu, gan bezrecepšu zālēm. Ja lietojat arī citas acu zāles, pārliecinieties pie acu ārsta par iespējām abas zāles lietot vienlaicīgi.

Grūtniecība un zīdīšanas periods:

POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus nedrīkst lietot grūtniecības laikā un zīdīšanas periodā, ja vien iespējamais ieguvums mātei neatsver iespējamo risku auglim un bērnam, kas tiek barots ar mātes pienu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana:

Nav ziņots par zāļu lietošanas negatīvu iespaidu uz spēju veikt darbības, kas prasa pastiprinātu uzmanību (mehānisko transportlīdzekļu vadīšana, iekārtu apkalpošana, darbs lielā augstumā). Tūlīt pēc zāļu lietošanas var pazemināties redzes asums, tādēļ ieteicams šīs darbības neveikt ne ātrāk kā 15 minūtes pēc zāļu lietošanas.

Svarīga informācija par kādu no POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienu sastāvdaļām:

Nav.

3. KĀ LIETOT POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus.

Precīzas devas un zāļu lietošanas ilgumu nosaka ārsts. Parasti pilina pa 1 — 2 pilieniem 2 — 4 reizes dienā konjunktīvas maisā. Lietošanas ilgums nav ierobežots.

Pēc atvēršanas zāles paredzētas okulārai lietošanai.

Jānoskrūvē aizsargājošais vāciņš; pacients nedaudz atliec galvu atpakaļ, apgriez pudelīti ar pilinātāju uz leju un, saspiežot plastmasas pudelīti, iepilina apakšējā konjunktīvas maisiņā vajadzīgo daudzumu pilienus. Pilinātāja gals nedrīkst saskarties ar aci vai plakstiņiem. Visbeidzot, vāciņš cieši jāuzskrūvē atpakaļ, lai izvairītos no šķīduma inficēšanas. Pudelīte jāuzglabā vertikālā pozīcijā.

Ja vienlaikus lieto vairāk kā vienu vietēju oftalmoloģisku līdzekli, tie jālieto ar 10-15 minūšu intervālu.

Ja esat lietojis POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus vairāk nekā noteikts:

Nejaušas pārdozēšanas gadījumā ieteicama skartās acs skalošana ar remdenu ūdeni.

Ja esat aizmirsis lietot POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus:

Ja izlaidāt parakstīto devu, iepiliniet POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus tiklīdz atceraties, un turpiniet lietot zāles pēc ierastās shēmas. Ja esat izlaidis vairākas devas, ieteicams konsultēties ar ārstējošo ārstu vai farmaceitu par tālāku preparāta lietošanu.

Ja Jūs pārtraucat lietot POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus:

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Parasti organisms labi panes POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus. Tūlīt pēc iepilināšanas var rasties viegla dedzināšana vai skropstu salipšana.

Nekontrolēta un ilgstoša lietošana (pārmērīgās devās) jutīgiem pacientiem var izraisīt tā dēvēto "jodismu". Tas izpaužas kā konjunktīvas kairinājums un piepildīšanās ar asinīm, pastiprināta asaru sekrēcija, līdz pat plakstiņu tūskai un asaru dziedzera tūskai, var parādīties ādas apsārtums, izsitumi, iekaisums un sīki asinsizplūdumi.

Ja pamanāt kādu no iepriekš minētājām blakusparādībām vai kādu citu neparastu reakciju, par to jāpastāsta ārstam.

5. KĀ UZGLABĀT POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienus.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Neatdzesēt. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas.

Zāles nav lietojamas, kad beidzies uz iesaiņojuma norādītais derīguma termiņš. Atvērts iesaiņojums izlietojams 28 dienu laikā. Pēc katras zāļu lietošanas pudelīte tūlīt cieši jāaizver.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA.

Ko POTASSIUM IODIDE 2% acu pilieni satur:

Aktīvā viela: viens mililitrs šķīduma satur 20 mg kālija jodīda. 1 ml = 20 pilieni.

Citas sastāvdaļas ir: hlorheksidīna diacetāts, nātrija hlorīds, nātrija tiosulfāts, dinātrija edetāta dihidrāts, ūdens injekcijām.

POTASSIUM IODIDE 2% acu pilienu ārējais izskats un iepakojums

Izskats: dzidrs, bezkrāsains šķīdums. Polietilēna pudelīte ar pipeti, skrūvējams polietilēna vāciņš, etiķete. Pudelītes ir iesaiņotas kartona kārbīnās kopā ar lietošanas instrukciju. Iesaiņojuma lielums: 1 x 10 ml.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

UNIMED PHARMA Ltd., Bratislava, Oriškova 11, 821 05, Slovākijas Republika.



Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību Latvijā:

UNIMED PHARMA Ltd., pārstāvniecība

Madonas iela 19-5, Rīga, LV 1084

Tel/Fax: + 371 67 546 032

E-pasts: unimedpharma@inbox.lv